阿部白桃

品種名：阿部白桃
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：鮮紅色
表皮絨毛：硬毛
皮剝離難易：皮厚,完熟後易剝離
果肉顏色：白肉,近核處紅色
果肉質地：硬溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：400
可溶性固形物 (˚Brix)：11.6
可滴定酸(%)：0.28
產量：中等
核顏色：紅色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食



山梨白桃

品種名：山梨白桃
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：紅褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：橢圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：玫瑰紅,有塊狀斑
表皮絨毛：短,密
皮剝離難易：熟果易剝皮
果肉顏色：白肉,近核處紅色
果肉質地：纖維粗短
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：231.7
可溶性固形物 (°Brix)：9.3
可滴定酸(%)：0.51
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食



清水白桃

品種名：清水白桃
來源：原產日本岡山縣,為偶然實生苗選出
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：3月中上旬
成熟期：6月下旬
葉型：卵圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺,較明顯
果頂形狀：圓,凹入
對稱性：對稱
果皮顏色：乳白色,頂及向陽面有紅色暈
表皮絨毛：密
皮剝離難易：熟果易剝皮
果肉顏色：乳白色,近核處與肉色同
果肉質地：鬆軟,纖維中等,汁多
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：225
可溶性固形物 (˚Brix)：12.4
可滴定酸(%)：0.12
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

川中島白桃

品種名：川中島白桃
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月下旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：近圓形

縫合線：明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色淡黃色,著紅暈
表皮絨毛：長
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色,近核有粉紅色
果肉質地：細,汁液中等,
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：240
可溶性固形物 (˚Brix)：12
可滴定酸(%)：0.22
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

瀨戶內白桃

品種名：瀨戶內白桃
來源：日本
樹姿：半張開
樹勢：強健
開花期：3月上旬
成熟期：7月下旬-8月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色白著紅暈
表皮絨毛：短毛
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉,近核紅色
果肉質地：肉質細,汁液多,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：236.9
可溶性固形物 (˚Brix)：13.9
可滴定酸(%)：0.16
產量：中等
核顏色：紅色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食



秋白桃

品種名：秋白桃
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月中旬
葉型：卵圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面帶紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形或圓形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：淺黃綠色,帶紅斑
表皮絨毛：短,少
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉,近核處帶少量粉紅色
果肉質地：細軟,纖維汁液中等
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：295
可溶性固形物 (˚Brix)：11
可滴定酸(%)：0.17
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

泉白桃

品種名：泉白桃
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：短突尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：扁圓形
縫合線：中深,明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色乳白,腹面著紅暈
表皮絨毛：長,中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉
果肉質地：鬆軟,汁液多,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：140.9
可溶性固形物 (˚Brix)：17.4
可滴定酸(%)：0.26
產量：豐產
核顏色：木黃色帶淡紅色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

紅鳳

品種名：紅鳳
來源：原產日本,為山根白桃及都白　雜交育成
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：4月中上旬
成熟期：7月上旬
葉型：披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：扁圓形或近圓形

縫合線：淺,較明顯
果頂形狀：圓,凹入
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白色,近核處有紅色
果肉質地：鬆軟,纖維少,汁液中等
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：152.5
可溶性固形物 (˚Brix)：11.5
可滴定酸(%)：0.35
產量：中等
核顏色：豐產
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

桃 Peach

白鳳

品種名：白鳳
來源：由神奈川農業試驗場於1924年以白桃與桔早生雜交育成
樹姿：開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：7月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺,不明顯
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：乳白色,有紅色條紋斑
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色,近核處稍帶淡紅色
果肉質地：細,硬溶質,纖維少,多汁
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：160
可溶性固形物 (°Brix)：11
可滴定酸(%)：0.22
產量：豐產
核顏色：木黃帶淺玫瑰紅
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食,加工

武井早生白鳳

品種名：武井早生白鳳
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面呈褐面
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：扁圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平,微凹
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：全果紅暈,有深紅色條斑
表皮絨毛：短
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色
果肉質地：細,多汁,纖維多
果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：172.6
可溶性固形物 (˚Brix)：12.6
可滴定酸(%)：0.38
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

八幡白鳳

品種名：八幡白鳳
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月上旬
成熟期：6月下旬-7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：深,
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：紅,有條斑
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色
果肉質地：鬆軟,纖維中等,汁液多
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：155
可溶性固形物 (˚Brix)：12.7
可滴定酸(%)：0.21
產量：豐產
核顏色：褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

長澤白鳳

品種名：長澤白鳳
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：扁圓形

縫合線：淺
果頂形狀：微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：底色乳白,著紅暈
表皮絨毛：短,稀
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色
果肉質地：細,多汁,纖維多
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：135.5
可溶性固形物 (˚Brix)：11.4
可滴定酸(%)：0.11
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

大玉白鳳

品種名：大玉白鳳
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬
葉型：卵圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面呈紅褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：扁圓形
縫合線：頂部較淺,腹部較深
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：底色乳白,向陽面著紅暈
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色,近核處帶粉紅色
果肉質地：細,多汁
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：188.3
可溶性固形物 (˚Brix)：11.7
可滴定酸(%)：0.29
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

御板白鳳

品種名：御坂白鳳
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：6月下旬-7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面呈褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：扁圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色,有白色細點
表皮絨毛：短,中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：白肉帶淡粉紅色
果肉質地：鬆軟,多汁,纖維長
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：179.7
可溶性固形物 (˚Brix)：11.9
可滴定酸(%)：0.16
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

都白鳳

品種名：都白鳳
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：中等
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：底色淺黃,帶紅色細點
表皮絨毛：細少
皮剝離難易：熟果易剝離
果肉顏色：白肉
果肉質地：鬆軟,纖維中粗
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：139.8
可溶性固形物 (°Brix)：14.1
可滴定酸(%)：0.23
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

新白鳳

品種名：新白鳳
來源：武陵農場自白鳳苗中選出
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中上旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：深綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面呈褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形或圓形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：扁圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：稍不對稱
果皮顏色：底色乳白,著紅暈
表皮絨毛：細,中等
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：乳白色
果肉質地：鬆軟,多汁,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：204.2
可溶性固形物 (˚Brix)：11.8
可滴定酸(%)：0.21
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵形
用途：鮮食

八重咲蟠桃

品種名：八重咲蟠桃
來源：日本
樹姿：半開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形,重瓣
花色：深粉紅色
果型：扁平
縫合線：淺
果頂形狀：凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：紅
表皮絨毛：細多
皮剝離難易：不易
果肉顏色：白肉
果肉質地：硬
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：90
可溶性固形物 (˚Brix)：8.9
可滴定酸(%)：0.45
產量：低
核顏色：木黃色
核形狀：扁平
用途：觀賞用

早生油桃

品種名：早生油桃
來源：美國
樹姿：開張
樹勢：強健
開花期：3月上旬
成熟期：6月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面紅褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：淺粉紅色
果型：橢圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓凸
對稱性：對稱
果皮顏色：底色黃,頂部及腹面有紅斑
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：淡黃色
果肉質地：細,多汁
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：119
可溶性固形物 (°Brix)：11.3
可滴定酸(%)：0.75
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

黃金桃

品種名：黃金桃
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：中庸
開花期：3月中旬
成熟期：7月下旬-8月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：向陽面易褐色銹斑
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：圓形或腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：黃色
表皮絨毛：中等
皮剝離難易：皮厚,不易剝離
果肉顏色：黃色,近核處有少量紅色
果肉質地：肉質細密,纖維少而長,多汁,溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：265
可溶性固形物 (˚Brix)：15.8
可滴定酸(%)：0.13
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食



油桃4號

品種名：油桃4號
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：中庸
開花期：3月上旬
成熟期：7月中旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：不對稱
果皮顏色：紅色,向陽面有細點
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮不能剝離
果肉顏色：淺黃色
果肉質地：汁液多,纖維細少為硬溶質
果肉與核之粘離：半離核
平均果重 (g)：94
可溶性固形物 (˚Brix)：12.1
可滴定酸(%)：0.43
產量：中等
核顏色：木黃色帶紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

油桃5號

品種名：油桃5號
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓形
對稱性：不對稱
果皮顏色：紅色,向陽面有細點
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮不能剝離
果肉顏色：乳白色
果肉質地：汁液多,纖維粗,溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：191.2
可溶性固形物 (˚Brix)：10.1
可滴定酸(%)：0.93
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

油桃6號

品種名：油桃6號
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：中等
開花期：3月上旬
成熟期：7月上旬
葉型：披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：綠色,向陽面褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：底色淺黃,90%呈紅色
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：淺黃,近核處紅色
果肉質地：汁液少,纖維中粗,硬溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：163
可溶性固形物 (˚Brix)：13.3
可滴定酸(%)：0.80
產量：豐產
核顏色：木黃色帶紅色
核形狀：橢圓形
用途：鮮食

油桃8號

品種名：油桃8號
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：卵圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：鮮紅色,果頂有白點
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：淺黃色,近核紅色
果肉質地：細軟多汁,纖維中粗
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：134.8
可溶性固形物 (˚Brix)：12.9
可滴定酸(%)：0.50
產量：豐產
核顏色：紅褐色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

油桃9號

品種名：油桃9號
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：楔形
腺體：2-4個,腎形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：圓形

縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凸
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色,向陽面有細點
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：乳白色,近核處有少量紅色
果肉質地：汁液多,纖維中等,溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：135
可溶性固形物 (°Brix)：10.8
可滴定酸(%)：0.76
產量：豐產
核顏色：紅色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

油桃14號

品種名：油桃14號
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：鈍鋸齒狀
葉尖形狀：漸尖
葉基部形狀：寬楔形
腺體：腎形
花型：鈴形
花色：粉紅色
果型：近圓形
縫合線：不明顯
果頂形狀：圓平
對稱性：對稱
果皮顏色：紅色,果頂有白點
表皮絨毛：無
皮剝離難易：皮不易剝離
果肉顏色：淺黃色
果肉質地：軟溶質
果肉與核之粘離：黏核
平均果重 (g)：134
可溶性固形物 (°Brix)：11.6
可滴定酸(%)：0.35
產量：豐產
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：鮮食

罐桃11號

品種名：罐桃11號
來源：日本
樹姿：開張
樹勢：強
開花期：3月中旬
成熟期：7月上旬
葉型：長橢圓披針形
葉色：綠色
一年生枝條顏色：褐色
葉緣形狀：細鋸齒狀
葉尖形狀：急尖
葉基部形狀：楔形
腺體：腎形
花型：薔薇形
花色：粉紅色
果型：扁圓形
縫合線：淺
果頂形狀：圓,微凹
對稱性：對稱
果皮顏色：金黃色
表皮絨毛：長,多
皮剝離難易：皮易剝離
果肉顏色：淺黃色
果肉質地：汁液多,纖維中等,不溶質
果肉與核之粘離：離核
平均果重 (g)：180
可溶性固形物 (°Brix)：14.3
可滴定酸(%)：0.28
產量：中等
核顏色：木黃色
核形狀：倒卵圓形
用途：加工

桃 Peach
Peach variety illustrations

國家圖書館出版預行編目資料

桃品種圖鑑= Peach variety illustrations/
温英杰作台中市霧峰區，農業委員會農業試驗所
民100.11
版面： 15 × 21 公分 (菊16開)
ISBN :978-986-03-1222-5 (平裝)
1.落葉果樹 2.種原多樣性 3.科普教育

發 行 人：陳駿季
作　　者：温英杰
編　　輯：張靜誼、許峻豪、許益誌
出 版 者：行政院農業委員會農業試驗所
地　　址：413 台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電　　話：(04)2330-2301
網　　址：http://www.tari.gov.tw
印　　刷：峰林實業有限公司
出版日期：100年12月
定　　價：150元
ISBN：978-986-03-1222-5
GPN：1010004869



Peach variety illustrations

桃品種圖鑑

行政院農業委員會農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
地址：413 台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電話：(04)2330-2301　傳真：(04)23338162

ISBN978-986-03-1222-5
9 789860 312225
GPN:1010004869

teldap.tw
數位典藏與數位學習 國家型科技計畫
Taiwan e-Learning & Digital Archives Program